

Syphilis

Kiła Informacja dla Pacjenta

The Department of Genitourinary Medicine
Lauriston Building
Lauriston Place
Edinburgh

CZYM JEST KIŁA?

Kiła jest chorobą zakaźną powodowaną przez bakterię o nazwie *Treponema pallidum*, czyli krętek blady.

JAK MOGĘ SIĘ ZARAZIĆ KIŁĄ?

Kiła można się zarazić zazwyczaj poprzez seks z zarażoną osobą. Obejmuje to seks oralny (także rimming), pochwowy i analny. Bakteria wnika w skórę a następnie rozprzestrzenia się po całym ciele. Kiła może być przeniesiona z matki na dziecko w czasie ciąży, ale w UK zdarza się to rzadko.

JAKIE SĄ OBJAWY KIŁY?

U wielu ludzi nie ma żadnych objawów kiły, a zakażenie może być stwierdzone tylko na podstawie badania krwi. Nazywamy to kiła utajoną.

U innych ludzi w miejscu wnikięcia krętka do skóry pojawia się wrzód – zazwyczaj na penisie, w pochwie, na odbycie lub w ustach. Wrzód ten jest zazwyczaj bezbolesny, za wyjątkiem ust lub odbytu, gdzie może być bolesny. Pojawia się zazwyczaj 4 do 6 tygodni po zakażeniu, choć może się nie pojawiać nawet przez 3 miesiące.

Jeśli kiła nie zostanie poddana leczeniu na tym etapie, wrzód ulega wygojeniu w ciągu około 3 – 8 tygodni.

U wielu ludzi występują wtedy objawy drugiego etapu kiły, kiły wtórnej:

- wysypka na skórze całego ciała, włącznie z dłońmi i stopami,
- powiększone węzły chłonne na szyi, pod pachami i w pachwinach,
- wrzody lub zmiany brodawkowe wokół odbytu, narządów płciowych żeńskich, w ustach,
- lekka gorączka i zmęczenie.

Te objawy kiły wtórnej mogą pojawiać się i ustępować przez około rok, a potem całkowicie zniknąć.

JEŚLI U MNIE POJAWIŁY SIĘ TE OBJAWY A POTEM USTĄPIŁY, CZY TO ZNACZY, ŻE WYZDROWIAŁEM/AM I NIE MOGĘ NIKOGO ZARAZIĆ?

NIE! Zarazek jest nadal w Twoim ciele i jeśli kiła nie zostanie poddana leczeniu, może wywołać wiele szkód w mózgu i sercu wiele lat później.

Możesz łatwo zarazić partnera seksualnego w ciągu pierwszych 2-3 lat po zakażeniu się kiłą. Po tym czasie z pewnych powodów kiła nie przenosi się już drogą kontaktu seksualnego, ale matka nadal może zarazić dziecko w czasie ciąży.

JAK MOŻNA STWIERDZIĆ U KOGOŚ KILĘ?

Jedynym pewnym sposobem stwierdzenia zakażenia kiłą jest badanie krwi. Nawet 3 miesiące może trwać okres zanim badanie krwi będzie w stanie wykryć bakterię, dlatego czasami trzeba powtórzyć badanie po kilku miesiącach.

CZY KIŁA JEST ULECZALNA?

TAK! Kiła jest całkowicie uleczalna, a u osób poddanych leczeniu nie ma ryzyka chorób mózgu lub serca po latach.

Kiłę leczy się penicyliną. Pacjent dostaje kilka zastrzyków: jeden podawany w każdy pośladek po zdiagnozowaniu choroby i powtórnie po 7 dniach, czasami niezbędny jest 3 zastrzyk. Nie powinieneś utrzymywać żadnych kontaktów seksualnych aż do czasu po otrzymaniu ostatniego zastrzyku penicyliny. Dla niektórych pacjentów zastrzyki te nie są zbyt przyjemne, u innych występują objawy podobne do grypy kilka godzin po zastrzyku (powodowane jest to przez zabijającą bakterie penicylinę). Te objawy kiły szybko ustępują.

JĘŚLI WIESZ, ŻE JESTEŚ UCZULONY NA PENICYLINĘ, NALEŻY BEZWZGLĘDNI POWIEDZIEĆ O TYM PERSONELOWI MEDYCZNEMU.

Mamy inne antybiotyki, które możemy stosować u osób uczulonych na penicylinę.

CO SIĘ DZIEJE PO LECZENIU?

Jedynym sposobem upewnienia się, że kiła została wyleczona jest wykonanie badań krwi 1, 3, 6, 12 i 24 miesiące po zakończeniu leczenia antybiotykiem.

JAK MOGĘ ZAPOBIEC ZARAŻENIU SIĘ KIŁĄ?

Stosowanie kondomów w czasie stosunku pochwowego i analnego jest najlepszym sposobem zmniejszenia ryzyka złapania kiły. Stosowanie kondomów w czasie seksu oralnego może również pomóc. Kondomy nie chronią całkowicie przed kiłą.

Zmniejszenie liczby partnerów seksualnych również może zmniejszyć ryzyko zakażenia kiłą.

Pamiętaj, że jeśli raz leczono Cię z powodu kiły nie oznacza to, że nie możesz zarazić się ponownie!

Opublikowane: Październik 2004. Tłumaczenie: PMK Lipiec 2006.