

## **Sífilis**

### **Hoja informativa para pacientes**

Departamento de Medicina Genitourinaria

Lauriston Building  
Lauriston Place  
Edinburgh

#### **Que es la Sífilis?**

Sífilis es una infección causada por un germen llamado Treponema Pallidum

#### **Como se contagia la Sífilis?**

La Sífilis se contagia generalmente a través de contacto sexual con una persona infectada. Puede ser por sexo oral, vaginal o anal. Este germen se penetra en la piel y se disemina a través del cuerpo. También puede pasar de la madre al hijo durante la gestación, pero esto es raro en el Reino Unido.

#### **Cuales son los signos o síntomas de la Sífilis?**

En muchas personas no hay signos y la infección solo se descubre a través de una prueba de sangre. Esto se llama Sífilis latente.

En otras personas aparece una ulcera en el lugar donde entro en germen - generalmente el pene, la vagina, el ano o la boca. La ulcera, también llamada el Chancro, es generalmente indolora excepto en la boca o el ano donde puede doler. Aparece generalmente de 4 a 6 semanas después de que el germen entro, aunque a veces tarda hasta 3 meses.

Si no se trata en esta etapa, la ulcera se cura en unas 3 a 8 semanas. Entonces mucha gente sufre los signos de la segunda etapa de la Sífilis:

Picor de la piel en todo el cuerpo incluyendo las palmas de manos y pies.  
Ganglios inflamados en el cuello, las axilas y la ingle.  
Ulceras o verrugas en el ano, genitales femeninos o en la boca.  
Fiebre ligera y cansancio.

Estos signos de la sífilis segunda etapa pueden aparecer y desaparecer por 1 año y después desaparecer del todo.

#### **SI TUVE ESTOS SIGNOS Y DESAPARECIERON, SIGNIFICA QUE ESTOY CURADO Y NO CONTAGIO?**

NO!! el germen aun esta en tu cuerpo y si la sífilis no se trata puede haber mucho mas daño en el cerebro y el corazón muchos anos mas tarde .

Puedes contagiar fácilmente a tu pareja sexual por 2 a 3 años desde que tu te infectaste. Después de este tiempo, por algún motivo, ya no se trasmite mas a través del sexo, aunque se puede transmitir de madre a hijo en el embarazo.

#### **COMO SE PUEDE SABER SI UNO TIENE SIFILIS?**

La única forma segura de saber si una persona tiene o no la infección a través de una prueba de sangre. Puede tardar hasta 3 meses después del contagio para que la prueba sea positiva, por lo que a veces es necesario repetir la prueba unos meses más tarde.

### **SE PUEDE CURAR LA SIFILIS?**

¡Sí! es completamente curable y la gente que se trata no tiene riesgo de daño al cerebro o al corazón años más tarde.

La sífilis se trata con penicilina. Se dan varias inyecciones: una en cada nalga cuando se diagnostica y se repite 7 días más tarde; a veces una tercera inyección es necesaria. Debería no practicar nada de sexo hasta después de la última inyección de penicilina. Algunos encuentran estas inyecciones algo molestas y otros muestran como un resfrío a pocas horas de la primera inyección (esto es porque los gérmenes se mueren por la penicilina). Los signos de la sífilis se curan rápidamente.

### **SI TU SABES QUE ERES ALERGICO A LA PENICILINA ES IMPORTANTE QUE SE LO DIGAS AL MEDICO O A LAS ENFERMERAS**

Hay otros antibióticos que se pueden usar para quienes son alérgicos a la penicilina.

### **QUE PASA DESPUES DEL TRATAMIENTO?**

La única forma segura de saber si la sífilis ha sido curada es a través de pruebas de sangre que se hacen 1, 3, 6, y 12 meses después de haber terminado las inyecciones.

### **COMO PUEDO EVITAR LA SIFILIS?**

EL USO DE CONDONES en el sexo vaginal, anal y oral es la mejor forma de reducir el riesgo de adquirir la sífilis. Sin embargo los condones no siempre te protegen.

Reducir el número de parejas sexuales puede también ayudar a reducir el riesgo de contagio.

Recuerda que si ya has sido tratado de sífilis antes, esto no evita que te contagies de nuevo.